



DIAMICRON[®] MR

Gliclazida 30mg

ADVERTENCIAS:

Este medicamento puede provocar hipoglucemias:

En caso de sudores, hambre perentoria, temblores, palidez, alteraciones de la visión, sensación de malestar, anomalías del comportamiento, absorber inmediatamente azúcar o un alimento azucarado y solicitar la opinión de su médico.

La hipoglucemia está favorecida por un régimen demasiado estricto o mal equilibrado, por un esfuerzo importante o prolongado, por la ingestión de alcohol o en la asociación de otros medicamentos hipoglucemiantes. Por consiguiente, el tratamiento con una sulfamida hipoglucemiante impone: Una regularidad en la alimentación: es importante tomar las comidas con regularidad, incluso el desayuno, no saltar ninguna comida, debido al aumento de riesgo de aparición de hipoglucemia en caso de alimentación insuficiente o de desequilibrio en azúcar.

Una perfecta regularidad en la toma del medicamento: es importante tomar el producto con regularidad una vez al día, de preferencia en el desayuno.

Cualquier toma de DIAMICRON MR debe estar seguida de una comida.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

En caso de intervención quirúrgica, traumatismo, fiebre o infección, dificultades a alimentarse, En caso de que desee quedarse embarazada.

En caso de toma de otro medicamento en especial antiinflamatorio, betabloqueante, tratamiento corticoide. Informe también a su dentista de su tratamiento.

Toma de DIAMICRON MR, comprimido de liberación modificada con bebidas: Evitar las bebidas alcohólicas.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Embarazo: En caso de embarazo, el tratamiento de la diabetes debe hacerse obligatoriamente con insulina.

Avise a su médico si desea quedarse embarazada.

Si está embarazada, avise a su médico para que le prescriba un tratamiento más adecuado. El descubrimiento de una gestación mientras está tomando este medicamento exige la interrupción del tratamiento.

Lactancia: Está contraindicada en caso de tratamiento con este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES:

Debido a que pueden modificar de forma importante la glucemia, se deben evitar algunas asociaciones medicamentosas.

Indique a su médico si ha tomado recientemente otro medicamento, en especial danazol (medicamento hormonal), corticoides, diuréticos, miconazol, así como alcohol.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

La posología media es de 1 a 4 comprimidos al día de una sola toma. Se recomienda tomar este medicamento en el desayuno.

Los comprimidos deben ingerirse enteros con medio vaso de agua, inmediatamente antes del desayuno. La toma única diaria de DIAMICRON MR, comprimido de liberación modificada, debe estar siempre seguida de una comida.

EFECTOS ADVERSOS:

Manifestaciones hipoglucémicas (sudores, palidez, malestar)

Manifestaciones cutáneas: urticaria, prurito, erupciones cutáneas.

Transtornos digestivos: náuseas, molestias gástricas, constipación, hepatitis.

Anomalías biológicas y sanguíneas.